

## Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS Bordeaux-Cartierville—St-Laurent, 2005

### Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1

| Indicateurs  | Population estimée | Mesure % | Intervalle de confiance à 95 % | Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal |   |        |
|--|--------------------|----------|--------------------------------|--|---|--------|
|  |                    |          |                                | -100 %   | 0 | +100 % |
| <b>Habitudes de vie</b>  |                    |          |                                |  |   |        |
| Fumeurs  | 24 500             | 22       | [16,3 ; 27,5]                  |  |   |        |
| Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus                                  | 44 400             | 43       | [35,9 ; 50,0]                  |  |   |        |
| Faible fréquence de l'activité physique  | 27 400             | 25       | [18,7 ; 30,6]                  |  |   |        |
| Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)     | 33 700             | 29       | [22,9 ; 35,2]                  |  |   |        |
| 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine                       | 1 800              | 1 **     | [ 0,3 ; 4,1]                   |  |   |        |
| Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)                  | 10 700             | 10 *     | [ 5,9 ; 14,3]                  |  |   |        |
| <b>Environnements social et physique</b>                                       |                    |          |                                |  |   |        |
| Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale                         | 55 200             | 49       | [42,5 ; 56,5]                  |  |   |        |
| Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison                   | 12 100             | 14 *     | [ 9,1 ; 20,3]                  |  |   |        |
| <b>État de santé générale</b>  |                    |          |                                |  |   |        |
| Perception négative de l'état de santé   | 9 700              | 9 *      | [ 5,2 ; 12,3]                  |  |   |        |
| Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie | 23 500             | 21       | [15,5 ; 26,6]                  |  |   |        |
| Incapacité d'une journée ou plus au cours des 2 dernières semaines             | 13 600             | 12 *     | [ 8,2 ; 17,6]                  |  |   |        |
| <b>État de santé physique</b>  |                    |          |                                |  |   |        |
| Allergies alimentaires   | 5 200              | 5 *      | [ 2,3 ; 8,5]                   |  |   |        |
| Allergies autres qu'alimentaires   | 23 300             | 21       | [15,4 ; 26,3]                  |  |   |        |
| Asthme   | 7 600              | 7 *      | [ 3,7 ; 10,9]                  |  |   |        |
| Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus  | 10 800             | 21 *     | [13,5 ; 30,9]                  |  |   |        |
| Maux de dos (autres que fibromyalgie/arthrite)                                 | 15 800             | 14 *     | [ 9,8 ; 19,7]                  |  |   |        |
| Migraines  | 8 500              | 8 *      | [ 4,4 ; 12,0]                  |  |   |        |
| Hypertension - 45 ans et plus  | 11 600             | 23 *     | [15,3 ; 33,3]                  |  |   |        |
| Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus                                  | 37 500             | 36       | [29,3 ; 43,0]                  |  |   |        |
| Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus  | 14 100             | 13 *     | [ 8,8 ; 19,1]                  |  |   |        |
| Blessures (dernière année)   | 10 000             | 9 *      | [ 5,3 ; 13,6]                  |  |   |        |
| <b>État de santé mentale</b>   |                    |          |                                |  |   |        |
| Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus                | 7 500              | 7 *      | [ 3,7 ; 11,4]                  |  |   |        |
| Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus                             | 28 200             | 28       | [21,8 ; 35,0]                  |  |   |        |
| Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans                           | 26 900             | 38       | [29,1 ; 45,9]                  |  |   |        |
| <b>Services préventifs</b>   |                    |          |                                |  |   |        |
| Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus                           | 14 900             | 63       | [46,9 ; 77,9]                  |  |   |        |
| Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans                                    | 34 400             | 71       | [60,5 ; 80,8]                  |  |   |        |
| Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus                             | 19 500             | 53       | [40,9 ; 65,4]                  |  |   |        |
| <b>Services de première ligne</b>  |                    |          |                                |  |   |        |
| Avoir un médecin de famille  | 74 400             | 67       | [60,3 ; 73,0]                  |  |   |        |
| Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)                   | 72 700             | 65       | [58,8 ; 71,7]                  |  |   |        |
| Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)                         | 42 100             | 38       | [31,4 ; 44,5]                  |  |   |        |
| Avoir consulté un psychologue (dernière année)                                 | 4 700              | 4 *      | [ 2,0 ; 7,9]                   |  |   |        |
| Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)               | 13 400             | 12 *     | [ 7,9 ; 17,1]                  |  |   |        |
| Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)                      | 12 700             | 11 *     | [ 7,5 ; 16,5]                  |  |   |        |

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source :

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

Légende : CSSS vs Montréal

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible