

Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, Montréal, 2005

Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1

Indicateurs	Population estimée	Mesure %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre Montréal et le reste du Québec		
				-100 %	0	+100 %
Habitudes de vie						
Fumeurs	404 300	25	[23,4 ; 26,5]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	588 900	39	[37,8 ; 40,1]			
Faible fréquence de l'activité physique	323 100	20	[18,5 ; 21,4]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	351 800	21	[19,5 ; 22,4]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	111 500	7	[5,8 ; 7,6]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus au cours d'une année	241 600	15	[13,6 ; 16,1]			
Environnements social et physique						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	726 100	45	[43,0 ; 46,6]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	128 200	11	[9,3 ; 11,8]			
État de santé générale						
Perception négative l'état de santé	181 600	11	[10,1 ; 12,3]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	331 900	20	[19,0 ; 21,9]			
Incapacité d'une journée ou plus au cours des 2 dernières semaines	221 100	14	[12,4 ; 14,9]			
État de santé physique						
Allergies alimentaires	112 800	7	[6,1 ; 7,9]			
Allergies autres qu'alimentaires	420 700	26	[24,4 ; 27,5]			
Asthme	146 200	9	[8,0 ; 10,0]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	200 700	28	[25,2 ; 30,0]			
Maux de dos (autres que fibromyalgie/arthrite)	265 800	16	[15,1 ; 17,7]			
Migraines	154 400	10	[8,5 ; 10,6]			
Hypertension - 45 ans et plus	206 200	28	[26,0 ; 30,8]			
MPOC - 45 ans et plus	44 100	6	[4,9 ; 7,5]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	458 400	30	[28,7 ; 32,1]			
Obésité (IMC ≥ 30) - 18 ans et plus	196 800	13	[11,8 ; 14,3]			
Surplus de poids - 12 à 17 ans	19 200	17	[12,3 ; 23,5]			
Diagnostic d'une ITS - 15 à 49 ans	81 100	8	[6,8 ; 9,3]			
Blessures (dernière année)	182 400	11	[10,1 ; 12,4]			
État de santé mentale						
Perception négative de la santé mentale	71 300	4	[3,7 ; 5,2]			
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	184 900	12	[10,6 ; 13,0]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	401 700	27	[25,7 ; 29,1]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	378 000	37	[34,8 ; 39,3]			
Services préventifs						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	194 900	57	[53,4 ; 61,2]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	486 400	72	[69,7 ; 74,7]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	244 800	45	[42,4 ; 48,6]			
Services de première ligne						
Avoir un médecin de famille	1 094 700	68	[65,9 ; 69,2]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	1 080 500	67	[64,9 ; 68,3]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	567 300	35	[33,3 ; 36,7]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	98 700	6	[5,2 ; 6,9]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	216 100	13	[12,1 ; 14,5]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	216 700	13	[12,2 ; 14,6]			

Source :

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada, 2005.

Légende : Montréal vs Reste du Québec

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible